

โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

Checklist การปฏิบัติ/ดูแล ()ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา ()ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

Admit.....Dx.....ชนิดเชื้อ.....

() รับ Refer กรณีตรวจพบที่ รพ. เป็นการติดเชื้อ () CI () HAI

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (มาตรการ HIP)

หัวข้อการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
- แยกผู้ป่วยตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ		
H : Hand hygiene: ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย/ให้การพยาบาล		
I : Isolation precaution		
- ติดป้าย/สัญลักษณ์หน้าห้อง/หน้าต่าง ติดป้ายหน้า Chart (Contact precaution) เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทราบ		
- แยกผู้ป่วยเข้า () ห้องแยกโรค กรณีไม่มีห้อง () จัด Zoning		
- แยกอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง หม้อนอน และปรอทวัดไข้ จากผู้ป่วยทั่วไป		
- มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือหน้าเตียง/หน้าห้อง ของผู้ป่วย		
- ทำความสะอาดเตียงหรือ Unit ของผู้ป่วยด้วย 0.5% sodium hypochlorite ทุกวัน		
- ไม่นำ chart เอกสารทุกชนิดเข้าห้อง หรือวางบนเตียงผู้ป่วย		
- ก่อนย้ายผู้ป่วยไปนอนตึกต้องแจ้งให้จัดรับผู้ป่วยทราบทุกครั้ง		
- จำกัดคนเยี่ยมให้เหลือน้อยที่สุด,แนะนำญาติ		
- การทิ้งขยะติดเชื้อและการแยกผ้าติดเชื้อบรรจุในพลาสติกสีแดงและเขียนว่า “ ผู้ป่วยเชื้อดื้อยา”		
- จัดอาหารใส่ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียว		
P : Personal protective equipment		
- ใส่ถุงมือทุกครั้งสัมผัสผู้ป่วย		
- ใส่ Gown เมื่อทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่ง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย		
ลงชื่อพยาบาล ER/OPD	ลงชื่อพยาบาล Ward	

Sticker