

แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสารน้ำ สารละลาย น้ำยาต่าง ๆ โรงพยาบาลพัฒนภูมิพิสัย

ชนิดน้ำยา	ระยะเวลาเปลี่ยนหลังเปิดใช้
NSS, Sterile water	24ชม. หลังเปิดใช้
NSS, Sterile water ชนิด Nebule	ใช้แล้วเดียวทิ้ง
สารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด	24 ชม. หลังเปิดใช้
ยาขวดผสมสำหรับพ่น	1 เดือน
ยาชา ขวด	1 เดือน
น้ำสบูล้างมือ	7 วัน หลังแบ่งใส่ขวด
Alcohol 70%	1 เดือน หัวบี๋เปลี่ยนให้ยึดหลัก Aseptic technique และเปลี่ยนหัวบี๋ใหม่เมื่อมีการ Contaminate
Alcohol Hand Rub (ชื่อการค้า Handi-C)	2 เดือน ตามวันหมดอายุของบริษัทที่ผลิต
Hydrogen peroxide (H2O2) ขวดบรรจุบริษัท	1 ปี แต่ไม่เกิดวันหมดอายุของบริษัทที่ผลิต
4% Chlorhexidine (C - Scrub) ขวดบรรจุบริษัท	1 เดือน
7.5% Povidone Iodine (Scrub) ขวดบรรจุบริษัท	1 เดือน
10% Povidone Iodine (Solution) ขวดบรรจุบริษัท	1 เดือน
2% Chlorhexidine in Alcohol ขวดบรรจุบริษัทผลิต (ชื่อการค้า Prepskin-C)	1 เดือน
2% Chlorhexidine in Alcohol <u>ชนิดผลิตเอง</u>	3 วันหลังเปิดใช้
4% Chlorhexidine (C - Scrub) แบ่งบรรจุ	7 วัน
0.5% sodium hypochlorite (0.5% = 5000 ppm)	ภายใน 24 ชม. (ผสมเอง)
2% Glutaraldehyde(Cidex)	28 วัน หลังเติม activator มีการตรวจสอบความเข้มข้น ทุก 14 วัน ถ้าไม่ได้ความเข้มข้นตามที่กำหนดให้เปลี่ยนผสมใหม่
IV set	96 ชม. หลังเปิดใช้
IV Set drip ยา	24 ชม.หลังเปิดใช้
สายให้อาหาร (Nutri -drip)	24 ชม.
Blood Set	เปลี่ยนทุก Unit
สาย Suction	ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
สาย ออกซิเจน Canular Disposable	ใช้จนไม่จำเป็นต้องใช้ หรือเปลี่ยนเมื่อเปื้อน
Set พนยา	ใช้จนไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เกิน 7 วันให้เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนเมื่อเปื้อน
Mask with bag	ใช้จนไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เกิน 7 วันให้เปลี่ยน เปลี่ยนเมื่อเปื้อน
สายออกซิเจน	ใช้จนไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เกิน 7 วันให้เปลี่ยน
กระเปาะออกซิเจน	เปลี่ยน ทุก 24 ชม.

****** น้ำยาชนิดต่างๆ ทั้งชนิดขวด และ แกลลอน ห้าม เก็บไว้ใต้อ่างล้างมือ หรือซิงค์น้ำต่างๆ ให้ เก็บไว้ในตู้ที่แห้ง ไม่เปียกชื้น ให้เรียงเป็นระเบียบ ยึดหลัก **First In First Out** ****** เขียนป้ายระบุวันเปิด-วันหมดอายุ **IC 2563**